

**Рекомендации  
для руководителей птицеводческих хозяйств  
по организации противоэпидемических  
мероприятий на случаи регистрации  
заболеваний птиц, подозрительных на  
зоонозный грипп (грипп птиц)**

1. При выявлении клинических симптомов заболевания птиц, подозрительных на птичий грипп (запрокидывание головы, дискоординация движений, отказ от корма и воды, учащенный жидкий стул, повышение температуры, отсутствие реакции на местные раздражители, явления синусита и конъюнктивита; у кур – отёк и почернение гребня и серёжек) немедленно информировать местную ветеринарную службу в целях проведения отбора материала для вирусологических исследований.

2. Обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал (маски, защитные очки, халаты, непроницаемый фартук, резиновые сапоги и перчатки).

3. Не допускать до работы лиц старше 60 лет, а также страдающих сердечно-сосудистыми и лёгочными хроническими заболеваниями.

4. Организовать медицинское наблюдение за персоналом, контактирующим с инфицированной птицей. Отстранять от работы лиц с клиникой ОРВИ, желудочно-кишечных заболеваний.

5. Организовать с помощью работников здравоохранения и Роспотребнадзора проведение работающим профилактических прививок против гриппа инактивированными вакцинами.

6. Обеспечить засетчивание окон и дверей, исключающее возможность попадания летающей птицы в производственные помещения; не допускать совместного пребывания диких и домашних птиц.

7. Организовать для персонала питьевой режим бутилированной водой с использованием одноразовой посуды.

8. Обеспечить дезинфекцию использованной защитной одежды и утилизацию принадлежностей одноразового использования.

9. Усилить контроль со стороны администрации за соблюдением личной гигиены обслуживающим персоналом (обеспечить разовыми полотенцами, мылом).